

rustica

HEBDO

Bricolage

Monter une
maisonnette
en kit


Jardin

Arrosage, entretien :
limitez les corvées

**Plantez
& semez**
pour la rentrée

**SÉRIE
DE L'ÉTÉ**

LES SAVEURS DE NOS RÉGIONS
N°1 : LE GRAND SUD-EST



L 13509 - 2166 S - F : 1,00 €



Mardi
5

Antoine

● **SOLEIL**
Lever : 5 h 55
Coucher : 21 h 55

☾ **LUNE**
Lever : 10 h 55
Coucher : 23 h 51

 **JARDINER
AVEC
LA LUNE**

*Lune descendante.
Jour-graines et fruits.*

Taillez les gourmands des tomates, ces pousses qui naissent à l'aisselle des feuilles, les tiges qui ne portent pas de fruits ou celles, trop longues, des courges et des potirons. La sève alimentera mieux les rameaux fructifères.



LE BILLET DE XAVIER MATHIAS

Un mal pour un bien ?

Je cultive des légumes depuis des années, et les poireaux ont longtemps été, plus encore que les choux, une des productions phare de légumes-feuilles pour l'hiver. J'écris "ont été", puisque entre-temps est apparue *Phytomyza gymnostoma*, plus connue chez les jardiniers sous le désormais célèbre et redouté nom commun : mouche mineuse du poireau.

IL EST BIEN DIFFICILE DE LUTTER CONTRE CE NOUVEAU RAVAGEUR au cycle de vie particulier, capable de provoquer de gros dégâts même en plein hiver, par des températures très basses. Un phénomène plutôt rare chez les insectes. A priori, les seules et malgré tout aléatoires solutions

sont de couvrir les cultures et patienter. Les populations de mineuses diminueraient, voire disparaîtraient au fil du temps – 4 ou 5 longues années malgré tout. En attendant, des 15 000 poireaux que nous plantons chaque année, nous sommes passés à 2000, destinés à une production d'automne uniquement.

CELA DIT, SANS ALLER JUSQU'À REMERCIER CETTE MOUCHE redoutable – il ne faudrait tout de même pas exagérer, d'autant que je raffole des poireaux! –, je dois cependant lui concéder que c'est grâce à elle que j'ai cherché des légumes-feuilles d'hiver pour prendre le relais. J'ai ainsi pu découvrir les excellents et très faciles à réussir choux "Tronchuda", "Frisé Westlandse Winter", "Beurré de Jalhay", etc. Un mal pour un bien donc, comme souvent au potager...

Rotation des cultures, que semer et planter en été?
sur  www.rustica.fr/article2755

CATALOGUE



Sous les tropiques

Julien Mallet vient de reprendre les pépinières Daubas, rebaptisées Mallet-Daubas. Installé à Hyères (83), il possède plusieurs collections de plantes tropicales : bougainvillées, hibiscus botaniques et frangipaniers. Mais il propose aussi sur son site des nouveautés tels bananier nain chinois, chèvrefeuille tropical... *Plantes tropicales Mallet-Daubas*. Tél : 06 71 62 60 83 ou www.plantes-tropicales.com

LÉGUMES : LES BESOINS EN EAU

Où ils soient cultivés pour leurs fruits, leurs feuilles, leurs fleurs ou leurs racines, les légumes contiennent 80 % d'eau au minimum : la gestion des arrosages est donc fondamentale.



Avant de se soucier de la plante cultivée, il faut tenir compte de la terre, différente dans chaque jardin avec ses capacités inégales pour retenir l'eau, mais aussi des méthodes de culture (fréquence des binages, taille ou non, épaisseur des pailles...) qui influenceront aussi sur les arrosages. Enfin, bien sûr, tous les végétaux n'ont pas les mêmes besoins.

- **Les "chameaux"** sont ceux qui, hormis sécheresse exceptionnelle, peuvent se passer d'arrosages après le semis ou la plantation, sans que cela n'influe sur autre chose que leur calibre : carottes, panais, persils tubéreux, topinambours, pommes de terre, scorsonères, salsifis, ocas, courges, betteraves, mâche, ails, oignons, échalotes, fèves, pourpiers.
- **Les sobres** désignent ceux qu'une quantité d'eau régulière mais peu abondante contente, voire qui toléreront quelques périodes de stress hydrique sans pour autant faire chuter la récolte ou altérer la saveur : aubergines, tomates, poivrons, bettes à cardes, navets, radis de printemps et d'automne, poireaux, choux, chicorées, concombres, courgettes, basilic, mescluns, haricots.
- **Les exigeants** ne le sont pas forcément sur la quantité d'eau apportée, mais sur l'état général du sol qui doit être maintenu frais sans excès pour limiter les montées à graines prématurées, la fibrosité, etc. : épinards, laitues, fenouils, radis longs d'hiver, céleris-raves et branches, roquettes.